



한국의료분쟁조정중재원에서는 의료사고 관련 무료 상담을 진행하고 있습니다. 의료전문상담인력과 조사관(의료인), 심사관(법조인)이 있어 방문, 전화, 우편, 팩스, 인터넷으로 상담을 받을 수 있습니다.



위치 안내(서울 본원)



위치 안내(부산 지원)



- 이용시간: 월요일 ~ 금요일(오전 9시 ~ 12시, 오후 1시 ~ 6시)
- 방문상담을 하기 전 전화문의를 하시면 좀 더 빠른 상담이 가능합니다.
- 홈페이지(www.k-medi.or.kr)를 통해서도 상담이 가능합니다.



서울특별시 중구 후암로 110 서울시타워 18층(상담센터)
Tel. 1670-2545 Fax. 02-6210-0199 www.k-medi.or.kr

부산광역시 연제구 중앙대로 1000, 국민연금공단 부산회관빌딩 13층 (연산동)
Tel. 051-910-7300~1 Fax. 051-910-7399 www.k-medi.or.kr

사례 02 • 야간뇨의 정밀검사 없이 전립선절제술 후 증상 지속



꼭 알아두어야 할 의학정보

야간뇨의 원인은 전립선질환, 방광의 기능적 문제, 심장질환, 신장질환, 복용 약물, 수면장애, 생활습관 등 매우 다양합니다. 야간뇨로 병원에 내원하였을 때에는 본인의 기저질환과 과거 병력을 의료진에게 알린 후 면밀하게 상담하여 야간뇨의 정확한 원인을 파악하고 진단에 따른 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다.



비뇨의학과 치료 중 의료사고 예방 TIP



비뇨의학과 치료 중 발생할 수 있는 의료사고, 이것만 알아두면 예방할 수 있습니다.



한국의료분쟁조정중재원
Korea Medical Dispute Mediation and Arbitration Agency

비뇨의학과 의료사고 현황

의료중재원에서 감정완료 된 비뇨의학과 관련 107건의 사건 중 '의원'에서 36건이 발생하여 가장 많은 분포를 보였고, 의료유형별로는 '수술'이 70건으로 가장 많았습니다. 이 중 원인질환별 상위 3개 질환으로는 '성기능장애, 전립선비대, 요로결석'이 39건으로 수술의 55.8%를 차지 하였습니다.

보건의료기관 종별 현황

(2012년 4월 ~ 2018년 12월 감정완료일 기준, 단위: 건)

상급 종합병원	종합병원	병원	의원	계
29	27	15	36	107

의료유형별 현황

(2012년 4월 ~ 2018년 12월 감정완료일 기준, 단위: 건, %)

수술	진단	시술 및 처치	약물 치료	검사	기타	계
70 (65.4)	15 (14.0)	14 (13.1)	4 (3.8)	3 (2.8)	1 (0.9)	107 (100.0)

성기능장애	전립선비대	요로결석	그 외	계
16 (22.9)	12 (17.2)	11 (15.7)	31 (44.2)	70 (100.0)

사례 01 • 체외충격파쇄석술 후 신장파열로 출혈 발생



꼭 알아두어야 할 의학정보

체외충격파쇄석술은 비교적 안전한 치료이지만, 시술 후 이상증상이 발생할 수 있습니다. 따라서 시술 후에는 충분한 안정을 취하여야 하고, **옆구리 통증, 고열, 오한, 배뇨 통증, 육안 혈뇨** 등의 이상증상이 있을시 즉시 의료진에게 알리고 조치를 취해야 합니다.

비뇨의학과 치료전 꼭 알아두어야 할 의료사고 예방 TIP

01 시술 후 이상증상이 있을 경우 의료진에게 바로 알려주세요!

이상증상 : 옆구리 통증, 고열, 오한, 배뇨 통증, 육안 혈뇨 등

비뇨의학과 시술의 경우 외래에서 국소마취 하에 시술하는 경우가 많습니다. 체외충격파쇄석술도 이러한 경우로 비교적 안전한 치료에 해당하지만, 이상증상이 발생할 수 있습니다. 특히, 수차례 동일 시술 병력이 있거나, 고령, 출혈 고위험군(고혈압, 당뇨, 항혈전제 복용, 응고장애 등)에는 신장출혈 등의 합병증 발생 가능성이 높아집니다. 그러므로 시술 후에는 충분한 안정을 취하여야 하고, 이상증상이 의심되면 의료기관에 즉시 내원하여 의료진에게 알리고 적절한 처치를 받아야 합니다.

02 야간노 발생 시 원인을 정확히 진단을 받는 것이 중요해요!

야간노의 원인

- 생활습관(수분 과다섭취, 염분 과다섭취, 탄산, 카페인, 알코올 과다섭취 등)
- 야간노증(항이노호르몬의 감소)
- 방광기능장애(저방광용적, 배뇨곤 과다활동)
- 심리적 요인(불면증, 수면 중 각성장애)
- 질병적 요인(전립선비대, 당뇨, 요붕증, 신증후군 등)

야간노란 수면 중에 소변을 보기 위해 일어나 배뇨하는 것을 말합니다. 야간노의 원인은 매우 다양하므로 야간노의 치료를 위해서는 정확한 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 야간노 발생 시 본인의 생활습관과 기저질환, 과거 병력, 복용 약물 등을 의료진에게 자세히 알린 후 면밀히 상담하여야 하며, 원인 감별을 위한 검사(요역동학 검사, 방광경 검사, 초음파 검사 등)를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 중요합니다.